

# へるすめーかー臨時号

小牧工業高校 保健室

2018. 5


## ○麻疹（はしか）の感染が拡大しています！

現在、愛知県内において麻疹患者の発生が続いています。4月11日に沖縄旅行帰りの者で麻疹患者が発生し、その後5月5日までに県内で17名の麻疹患者が確認されています。

また、沖縄県では3月20日に麻疹と診断された台湾からの旅行客を発端に、5月3日時点で90名の患者が報告されています。今後、さらに感染が拡大する恐れがあります。

## ○麻疹とは

主な症状	<b>38℃前後の発熱</b> が2～4日続き、咳・鼻水など <b>風邪のような症状</b> が出る その後 <b>高熱（39℃以上）</b> が出るとともに、 <b>発疹が出現</b> する 多くは7～10日で症状が回復 肺炎や中耳炎を併発しやすく、1000人に1人の割合で脳炎が発生する
感染経路	空気感染・飛沫感染・接触感染 <b>感染力は非常に強く、感染する期間は、発症の1日前～解熱後3日頃まで</b> 免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症する
潜伏期間	約10日～12日
治療法	根治療法はなく、対症療法
予防方法	麻疹は感染力が非常に強く、手洗いやマスクだけでは予防できないため、 <b>予防接種が最も有効</b> （接種歴は母子健康手帳を確認） 麻疹のワクチンを2回接種していない人などは、 <b>予防接種の検討</b> を



## ○麻疹が疑われる場合

発熱や発疹等の症状から麻疹が疑われる場合は、

- ・マスクの着用
- ・事前に医療機関に「麻疹の疑いがある」ことを連絡し、速やかに受診  
→受診の際は公共交通機関の利用を避ける（感染拡大防止）  
心配なことなどがある場合は、最寄りの保健所に連絡を。



## ○麻疹の予防接種を受けた方がいい人は？

平成2年4月2日以降に生まれた人は、定期接種として2回の麻疹含有ワクチンを受けることになっています。それ以前に生まれた人は1回のワクチン接種のみの場合が多いです。

また、医療従事者・学校関係者・保育福祉関係者など麻疹に感染するリスクが高い人や、麻疹に感染することで周囲への影響が大きい場合、流行国に渡航する場合は予防接種の検討をお勧めします。

### <麻疹は出席停止になります>

麻疹の出席停止期間の基準は、「解熱した後3日を経過するまで」です。  
学校などにおいて流行を広げる可能性が高い感染症であるため、出席停止となります。